

## РЕЦЕПТЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФАРМАКОЛОГИИ

### Холинергические средства

Rp: Sol. Benzogexonii 2.5% - 1 ml  
D.t.d.N. 6 in amp.  
S. По 1 мл под кожу 1 раз в день

Rp: Lobelini hydrochloridi 0,002  
D.t.d.N. 50 in tabul.  
S. По 1 таблетке 2 раза в день

### Адоенергические средства

Rp: Ephedrini hydrochloridi 0,025  
D.t.d.N. 6 in amp.  
S. По 1 мл под кожу 1 раз в день

Rp: Octadini 0,025  
D.t.d.N. 20 in tabul.  
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Rp: Phentolamini hydrochloridi 0,025  
D.t.d.N. 10 in tabul.  
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды.

### Местные анестетики

Rp: Novocaini 0,5  
Natrii chloridi 1,5  
Aquae distillatae ad 200 ml  
M. Sterillizetur!  
D.S. Для инфильтрационной  
анестезии.

Rp: Ung. Anaesthesini 5% - 10,0  
D.S. Наружное.

### Наркотические анальгетики

Rp: Sol. Morphini hydrochloridi 1% - 1 ml  
D.t.d.N. 6 in amp.  
S. По 1 мл под кожу (взрослым)

### Нейролептики и транквилизаторы

Rp: Aminazini 2,5% - 2 ml  
D.t.d.N. 6 in amp.  
S. Для внутривенных вливаний по  
1-2 мл, предварительно развес-  
ти в 20 мл 5% раствора  
глюкозы

Rp: Meproteni 0,2  
D.t.d.N. 20 in tabul.  
S. По 1 таблетке 2 раза в день  
после еды

### Антидепрессанты и психостимуляторы

Rp: Sol. Coffeini natrii-benzoatis 10% - 1 ml  
D.t.d.N. 6 in amp.  
S. По 1 мл 2 раза в день под кожу

Rp: Sol. Corasoli 10% - 1 ml  
D.t.d.N. 6 in amp.  
S. По 1 мл 2 раза в день под кожу

Rp: Sol. Strychnini nitratis 1% - 1 ml  
D.t.d.N. 6 in amp.  
S. По 1 мл 2 раза в день под кожу

### Наркозные средства

Rp: Aetheri pro narcosi 100 ml  
D.S. Для ингаляционного наркоза

Rp: Hexenali 1,0  
D.t.d.N. 10 in amp.  
S. Для внутривенного наркоза.  
Развести 1 мл в 10 мл стерильного  
физ.раствора. Вводить медленно.

#### Снотворные средства

Rp: Phenobarbitali 0,1  
D.t.d.N. 6 in tabul.  
S. По 1 таблетке на ночь за 30 мин. до сна

#### Сердечные гликозиды

Rp: Digitoxini 0,0001  
D.t.d.N. 6 in tabul.  
S. По 1 таблетке 1 раз в день

Rp: Sol. Strophanthini 0.05% - 1 ml  
D.t.d.N. 10 in amp.  
S. По 0,5 мл в вену, предварительно  
развести в 20 мл 20% раствора глюкозы;  
вводить медленно

#### Гипотензивные средства

Rp: Clophelini 0,000075  
D.t.d.N. 50 in tabul.  
S. По 1 таблетке 1 раз в день

Rp: Dibazoli 0/04  
D.t.d.N. 20 in tabul.  
S. По 1 таблетке 3 раза в день

#### Диуретики

Rp: Dichlothiazidi 0,025  
D.t.d.N. 20 in tabul.  
S. По 1 таблетке 1 раз в день

Rp: Furosimidi 0,04  
D.t.d.N. 12 in tabul.  
S. По 1 таблетке 1 раз в день

#### Антикоагулянты

Rp: Heparini 20 000 ED - 5 ml  
D.t.d.N. 6 in amp.  
S. По 1 мл внутривенно или  
капельно

Rp: Neodicumarini 0,1  
D.t.d.N. 30 in tabul.  
S. Применять по указанию врача

#### Гормональные препараты

Rp: Susp.Hydrocortisoni 2,5 %- 5 ml  
D.t.d.N. 5 in amp.  
S. По 1 мл суспензии 1 раз в неделю  
интрасиновиально.

Rp: Ung. Prednisoloni 0,5% - 5,0  
D.S. Наружное. Смазывать  
пораженные участки кожи.

Rp: Sol. Testosteroni propionatis oleosae 1% - 1 ml  
D.t.d.N. 10 in amp.  
S. По 1 мл внутримышечно через день.

Rp: Thyreoidini obductae 0,1  
D.t.d.N. 50 in tabul.  
S. По 1 таблетке 3 раз в день

Rp: Mercazolili 0,005  
D.t.d.N. 20 in tabul.  
S. По 1 таблетке 3 раз в день

Антигистаминовые средства

Rp: Dimedroli 0,05  
D.t.d.N. 10 in tabul.  
S. По 1 таблетке 2 раз в день