

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ПРОФ. В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»**

**СБОРНИК РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,
изучаемые на циклах терапии, профпатологии и эндокринологии на кафедре внутренних
болезней №2**

Методическое пособие для самостоятельной работы студентов IV-VI курсов

Красноярск – 2010

Составители: доценты кафедры внутренних болезней №2 Осетрова Н.Б., Павлова Н.Ю., Панченко Т.Л., Штегман О.А., ассистенты Большакова Н.И., Виноградова Е.Ю., Путинцева И.В.

Под редакцией зав. каф. внутренних болезней №2 проф. Демко И.В.

Поводом для создания настоящего сборника рецептов послужило появление в последние годы на российском фармацевтическом рынке большого числа новых эффективных лекарственных средств, получивших широкое распространение в лечении терапевтических заболеваний. Такие лекарства содержатся только в новых лекарственных справочниках, в которых в большинстве случаев не приводится образец рецепта. Это обстоятельство способствует возникновению определённых затруднений при выписке рецептов на данные препараты у студентов. Настоящий сборник ставит своей задачей демонстрацию образцов выписки рецептов на препараты, изучаемых на циклах терапии, профпатологии и эндокринологии на кафедре внутренних болезней №2 и не подменяет собой справочники лекарственных средств. Список рецептов приводится по разделам терапии и курсам, на которых препараты изучаются. Один и тот же препарат может встречаться в разных разделах, но с разной сигнатурой, отражающей специфику его использования при разных заболеваниях. В итоге обучения на кафедре студенты должны уметь выписать рецепты на все лекарства, встречающиеся в сборнике.

СОДЕРЖАНИЕ

Пульмонология 4 курс.....	2 стр.
Пульмонология 5 курс.....	3 стр.
Пульмонология 6 курс.....	5 стр.
Кардиология 4-5 курсы.....	5 стр.
Кардиология 6 курс.....	7 стр.
Гематология 4 курс.....	8 стр.
Гематология 5 курс.....	9 стр.
Гематология 6 курс.....	10 стр.
Нефрология и ревматология 5 курс.....	12 стр.
Нефрология и ревматология 6 курс.....	14 стр.
Эндокринология 6 курс.....	16 стр.
Гастроэнтерология 4-6 курсы.....	18 стр.
ВПТ.....	19 стр.
Профпатология.....	21 стр.

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
4 КУРС

№	Рецепты	Аналоги
Противопаразитарные, антибиотики, противогрибковые и противовирусные		
1	<p>Rp.: Benzylpenicillini natrii 500000 ED. D.t.d.N.100 S. Внутримышечно, развести в изотоническом растворе NaCl по 1 млн через 4 часа.</p> <p>Rp.: Benzylpenicillini natrii 500000 ED. D. t.d.N.100 S. Внутривенно по 5 млн 4 раза в день, развести в 100мл изотонического раствора.</p>	
2	<p>Rp.: Tab. Ampicillini 0,25 N.20 D.S. Внутрь по 2 таблетки 4 раза в день.</p>	
3	<p>Rp.: Tab. Amoxicillini 0,5 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.</p>	Flemoxin Solutab
4	<p>Rp.: Tab. Amoxicillini / Ac. clavulanici 0,875/0,125 N.14 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.</p>	Amoxycloclav, Augmentin
5	<p>Rp.: Cephazolini natrii 1,0 D.t.d.N.20 S. Внутримышечно по 1,0 3 раза в день, развести в 5мл изотонического раствора хлорида натрия.</p>	Kefzol, Cefalexin
6	<p>Rp.: Cefotaximi natrii 1,0 D.t.d.N.20 S. Внутримышечно по 1,0 3 раза в день, развести в 3 мл воды для инъекций.</p>	Claforan, Cefabol
7	<p>Rp.: Ceftriaxonu 1,0 D.t.d.N.10 S. Внутривенно по 1,0 1 раз в сутки, развести в 100 мл изотонического раствора хлорида натрия.</p>	Rocefin, Ceftriaxol, Lendacin
8	<p>Rp.: Cefoperazonu 1,0 D.t.d.N.10 S. Внутримышечно по 1,0 2 раза в день, развести в 5мл изотонического раствора хлорида натрия</p> <p>Rp.: Cefoperazonu 1,0 D.t.d.N.10 S. Внутривенно по 1,0 2 раза в день, развести в 100мл изотонического раствора хлорида натрия.</p>	Cefobid, Cefoperabon
9	<p>Rp.: Cefepimi 1,0 D.t.d. N.10 S. Внутривенно по 1,0 2 раза в день, развести в 200 мл изотонического раствора хлорида натрия</p>	Maxipime
10	<p>Rp.: Sol. Gentamycini sulfatis 4% - 2ml D.t.d.N.10 in amp. S. Внутримышечно 2 мл 3 раза в день.</p>	
11	<p>Rp.: Amikacini sulfatis 0,5 D.t.d.N.10 S. Внутримышечно по 1,0 1 раз в день, развести в 5мл воды для инъекций.</p>	Amikin
12	<p>Rp.: Caps. Doxycyclini hydrochloridi 0,1 N.10</p>	Unidox Solutab

	D.S. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в день.	
13	Rp.: Tab. Erythromycini 0,25 N.10 D.S. Внутрь по 2 таблетке 4 раза в день. Rp.: Erythromycini phosphatis 0,1 D.t.d.N.60 S. Внутривенно медленно по 0,6 3 раза в день, развести в 100 мл изотонического раствора хлорида натрия.	
14	Rp.: Tab. Azithromycini 0,5 N.3 D.S. Внутрь по 1 таблетке за час до еды 1 раз в день 3 дня.	Sumamed, Hemomycin, Zitrolidum
15	Rp.: Tab. Rovamycini 1500000 ME N.16 D.S. Внутрь по 2 таблетки 2 раза в день. Rp.: Rovamycini 1500000 ME D.t.d.N.20 S. Внутривенно по 3 млн. ME 2 раза в день, развести 200мл 5% раствора глюкозы.	
16	Rp.: Tab. Clarithromycini 0,5 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.	Klacid, Fromilid
17	Rp.: Caps. Clindamycini 0,3 N.20 D.S. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в день.	Delacin
18	Rp.: Tab. Ciprofloxacini 0,5 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день. Rp.: Sol. Ciprofloxacini 0,2%- 100ml D.t.d.N.10 S. Внутривенно по 2 флакона 2 раза в день.	Cifrani, Ciprolet
19	Rp.: Tab. Levofloxacini 0,5 N.5 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день. Rp.: Levofloxacini 0,5 D.t.d.N.5 S. Внутривенно капельно медленно по 500 мг 2 раза в день.	Tavanic
20	Rp.: Tab. Moxifloxacini 0,4 N.5 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	Avelox
21	Rp.: Meropenemi 1,0 D. t.d.N.10 S. Внутривенно капельно по 1,0 2 раза в день, предварительно развести в 100 мл изотонического раствора хлорида натрия.	Meronem
22	Rp.: Tab. Metronidazoli 0,5 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.	Trichopol
Муколитики		
23	Rp.: Sol. Acetylcysteini 20% - 5ml. D.S. Для ингаляций, по 2,5 мл 3 раза в день через небулайзер. Rp.: Tab. Acetylcysteini 0,6 N.20 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день, растворить в 200мл воды.	ACC, Fluimucil
24	Rp.: Ambroxoli hydrochloridi 100ml D. t.d.N.1	Ambrobene, Lasolvan, Halixol, Ambrohexal

S. Внутрь по 1 мерной ложке 3 раза в день.

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
5 КУРС

№	Рецепты	Примеры торговых названий
Бронхолитики, муколитики, отхаркивающие и противокашлевые.		
1	Rp.: Sol. Aminophyllini 2,4% - 10 ml D.t.d.N.10 in amp. S. Внутривенно медленно по 10мл, развести в 10мл изотонического раствора хлорида натрия.	Euphyllin
2	Rp.: Tab. Theophyllini 0,2 N.50 D.S. Внутрь после еды по 1 таблетке 2 раза в день.	Theoprecum, Theotard
3	Rp.: Aeros. Fenoteroli 100 мкг D.t.d. N. 100 S. При приступе удушья 1-2 вдоха, не более 6 вдохов в сутки.	Berotec
4	Rp.: Formoteroli 12 мкг D.t.d. N. 30 in caps. S. Для ингаляций через хандихалер по 1 капсуле 2 раза в день.	Foradil, Atimos
5	Rp.: Aeros. Ipratropium bromidi 20 мкг D.t.d. N. 200 S. По 2 вдоха 4 раза в день.	Atrovent
6	Rp.: Aeros. Salbutamoli 100 мкг D.t.d. N. 200 S. При приступе удушья 1-2 вдоха.	Ventolin, Salamol, Saltos
7	Rp.: Tiotropium bromidi 18 мкг D.t.d. N.30 in caps. S. Для ингаляций через хандихалер по 1 капсуле 1 раз в сутки.	Spiriva
8	Rp.: Aeros. Fenoteroli / Ipratropium bromidi 50/20 мкг D.t.d. N.200 S. По 2 вдоха 4 раза в день.	Berodual
Противогрибковые.		
9	Rp.: Tab. Nystatini 250000 ED N.25 D.S. Внутрь по 2 таблетки 4 раза в день.	
10	Rp.: Caps. Flucanazoli 0,15 N.1 D.S. Внутрь по 1 капсуле 1 раз в день.	Diflucan, Diflazon, Mycosyst
Глюкокортикостероиды.		
11	Rp.: Ung. Hydrocortisoni 1% - 10,0 D.S. На пораженные участки кожи 1 раз в день. Rp.: Susp. Hydrocortisoni hemisuccinati 2,5%-5ml D.t.d. N. 10. S. Внутривенно, капельно 2 раза в день, развести в 250 мл изотонического раствора хлорида натрия.	Cortef
12	Rp.: Tab. Prednisoloni 0,005 N.30 D.S. Внутрь: 3 таблетки в 7 часов, 2 табл- 11ч, 1табл- 13ч.	

	Rp.: Sol. Prednisoloni hemisuccinati 2,5%- 1ml D.t.d. N.10 in amp. S. 2 мл растворить в 250 мл изотонического раствора хлорида натрия, вводить 2 раза в день.	
13	Rp.: Tab. Triamcinoloni 0,004 N.50 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день утром после еды.	Berlicort, Polcortolon, Kenalog
14	Rp.: Tab. Methylprednisoloni 0,004 N.20 D.S. Внутрь по 3 таблетки 1 раз в день утром после еды.	Methypred
15	Rp.: Aeros. Beclometasoni dipropionati 250 мкг D.t.d. N.200 S. По 2 ингаляции 2 раза в сутки.	Beclojet 50 мкг, 250 мкг Becotide, Nasobec
16	Rp.: Aeros. Fluticasoni propionatis 250 мкг D.t.d. N.60 S. По 2 ингаляции 2 раза в день.	Flixotidi 50 мкг, 125 мкг, 250 мкг Flixonase
17	Rp.: Salmeteroli / Fluticasoni propionatis 50/250 мкг D.t.d. N.60 S. По 1 вдоху 2 раза в день.	Seretide Multidisk (Salmeterol 50 мкг+ Fluticasone 100мкг, 250мкг, 500мкг)
18	Rp.: Budesonidi / Formoteroli 160/4,5 мкг D.t.d. N.60 S. По 1 вдоху 2 раза в день.	Simbicort turbuhaler (Budesonide 80мкг, 160мкг + Formoterol 4,5мкг)
19	Rp.: Aeros. Budesonidi 200 мкг D.t.d. N.200 S. По 2 ингаляции 2 раза в день.	Benacort, Pulmicort
20	Rp.: Aeros. Beclometasoni dipropionati/Formoteroli 100/6 мкг D.t.d. N.120 S. По 1 вдоху 2 раза в день.	Foster (Beclometasoni dipropionat 100 мкг + Formoterol 6 мкг)
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов		
21	Rp.: Tab. Zafirlukasti 0,02 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.	Accolate
22	Rp.: Tab. Montelukasti 0,01 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день вечером.	Singulair

**ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
6 КУРС**

№	Рецепты	Фирменные названия
Противовирусные препараты		
1	Rp.: Ung. Acicloviri 0,2 N.10 D.S. На пораженные участки кожи.	Zovirax

	Rp.: Tab. Acicloviri 0,4 N.20 D.S. Внутрь по 1 таблетке 5 раз в день.	
2	Rp.: Tab. Oseltamiviri phosphatis 0,07 N.5 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день в течение 5 дней.	Tamiflu
3	Rp.: Caps. Imidazilacetinamid ac. pentandici 0,09 N.7 D.S. Внутрь по 1 капсуле 1 раз в день в течение 5 дней.	Ingavirini
Анаболические стероиды		
4	Rp.: Tab. Methandrostenoloni 0,005 N20 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	Nerabol
5	Rp.: Nadroloni – 1,0 D.t.d.N5 in amp. S. Внутримышечно по 1мл 1 раз в 2 недели.	Retabolil
Антигистаминные лекарственные средства		
6	Rp.: Tab. Clemastini 0,001 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.	Tavegyl
7	Rp.: Tab. Chloropyramine 0,025 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.	Suprastin
8	Rp.: Tab. Loratadini 0,01 N. 10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	Claritine, Lomilan Clarotadin
9	Rp.: Tab. Fexofenadini hydrochloridi 0,18 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	Telfast, Fexadin
10	Rp.: Tab. Ebastini 0,01 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	Kestine
11	Rp.: Tab. Cetirizini 0,01 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	Zyrtec, Cetrine, Letizen
12	Rp.: Tab. Desloratadini 0,005 N. 5 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	Aerius
13	Rp.: Tab. Levocetirizini 0,005 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	Ksizal

**КАРДИОЛОГИЯ
4-5 КУРСЫ**

№	Рецепты	Аналоги
Сердечные гликозиды		
1.	Rp.: Tab. Digoxini 0,00025 N.50 D.S. По ½ таб. 2 раза в день внутрь Rp.: Sol. Digoxini 0,025% - 1 ml D. t. d. N. 10 in amp. S. По 1 мл в/в струйно на физ. р-ре однократно	
Ингибиторы АПФ		
2.	Rp.: Tab. Enalapriili 0,01 N.14 D.S. По 1 таб. 2 раза в день внутрь	Renitec
3.	Rp.: Tab. Captopriili 0,025 N.28 D.S. По 1 таб. под язык при кризе	Capoten
Бета-блокаторы		
4.	Rp.: Tab. Metoprololi 0,05 N.30 D.S. По 1 таб. 2 раза в день.	Corvitol, Egiloc, Betaloc ZOC (0,0125-0,1 продлённого действия)
5.	Rp.: Tab. Bisoprololi 0,01 N.30 D.S. По ½ таб. 1 раз в день внутрь.	Concor, Coronal
Диуретики		
6.	Rp.: Tab. Furosemidi 0,04 N.50 D.S. По 1 таб. утром натощак. Rp.: Sol. Furosemidi 1% - 1 ml D. t. d. N. 10 in amp. S. По 2 мл в/в струйно на физ. растворе.	Lasix
7.	Rp.: Tab. Spironolactoni 0,025 N.20 D.S. По 1 таб. утром внутрь.	Verospiron
8.	Rp.: Tab. Hydrochlorothiazidi 0,025 N.20 D.S. По 1 таб. утром натощак.	Hypothiazid
Антиагреганты		
9.	Rp.: Tab. Acidi Acetylsalicylici 0,5 N.10 D.S. По ¼ таб. 1 раз в день внутрь.	Aspirin-cardio (0,1), TromboASS (0,1)
10.	Rp.: Tab. Clopidogreli 0,075 N.14 D.S. По 1 раз в день.	Plavix
Антикоагулянты		
11.	Rp.: Sol. Heparini 5 ml D. t. d. N. 10 in amp. S. По 0,2 мл (1000 ME)/час в/в.	
12.	Rp.: Enoxaparini 0,6 ml D. t. d. N. 10 S. По 0,6 мл п/к 2 раза в день	Clexani
Тромболитики		
13.	Rp.: Streptokinasi 750000 ME D. t. d. N. 10 S. 250000 ME в/в струйно, затем 1250000 ME в/в капельно в течение 60 минут.	Streptase
Нитраты		
14.	Rp.: Tab. Isosorbidi dinitrati 0,04 N.40 D.S. По 1 таб. утром и в обед внутрь. Rp.: Sol. Isosorbidi dinitrati 0,1% - 10 ml D. t. d. N. 10 in amp. S. По 10 мл в час в/в капельно. Rp.: Aerosolum Isosorbidi dinitrati 12,4 D.S. По 1 дозе под язык перед нагрузкой.	Cardicet, Aerosolum "Isocet",
15.	Rp.: Tab. Isosorbidi mononitrati 0,04 N.30 D.S. По 1 таб. утром и в обед внутрь.	Monocinque, Efox, Efox long (0,05)
16.	Rp.: Tab. Nitroglycerini 0,0005 N.40	Тоже

	D.S. По 1 таблетке под язык при стенокардии. Rp.: Sol. Nitroglycerini 0,1 %- 10 ml D.t.d. N.10. in amp. S. В/в капельно по 5 мл в час.	Perlinganit
Антиаритмики		
17.	Rp.: Tab. Amiodaroni 0,2 N.60 D.S. По 1 таб. 2 раза в день (после еды) Rp.: Sol. Amiodaroni 5% - 3 ml D.t.d. N.10 in amp. S. 3 мл в/в медленно на 20 мл физ. раствора однократно	Cordarone
18.	Rp.: Tab. Verapamili 0,24 N.20 D.S. По 1 таб. 1 раз в день внутрь. Rp.: Sol. Verapamili 0,25%- 2 ml D.t.d. N.10 in amp. S. 2 мл в/в медленно на 20 мл физ. раствора однократно.	Isoptin SR
19.	Rp.: Procainamidi 10%-10 ml D.t.d. N.10 in amp. S. в/в медленно на физ. растворе.	Novocainamid
20.	Rp.: Sol. Lidocaini 2% -2 ml D.t.d. N 10 in amp. S. 5 мл в/в струйно на физ. растворе однократно.	
Нестероидные противовоспалительные		
21.	Rp.: Tab. Diclofenac-Natrii 0,025 N.30 D.S. по 1 таб. 3 раза в день после еды	Ortofen, Voltaren
Антибиотики		
22.	Rp.: Ceftriaxonu 2,0 D.t.d. N. 10 S. Для в/в введения растворить в 40 мл физ. Раствора. Вводить 1 раз в день.	
23.	Rp.: Vancomycini 0,5 D.t.d. N. 10 S. В/в капельно каждые 6 часов.	Vanmixan
24.	Rp.: Sol. Amikacini 0,5%- 2 ml D.t.d. N. 10 in amp. S. В/в струйно по 2 мл 2 раза в сутки	
Антидепрессанты		
25.	Rp.: Tab. Amitriptylini 0,025 N.10 D.S. По 1 таб. 3 раза в день внутрь.	
26.	Rp.: Tab. Sertralini 0,05 D.S. По 1 таб. в день внутрь.	Stimuloton
Противотревожные		
27.	Rp.: Caps. Etifoxini 0,05 N.24 D.S. По 1 капс. 3 раза в день внутрь до еды.	Strezam
Антагонисты кальция		
28.	Rp.: Tab. Nifedipini retardi 0,04 N.50 D.S. По 1 таб. 1 раз в день (после еды). Rp.: Tab. Nifedipini 0,01 N.100 D.S. По 1 таблетке разжевать при кризе.	Cordipin XL, Corinfar UNO Corinfar
Седативные		
29.	Rp.: Tab. Diazepam 0,005 N. 100 D.S. По 1 таб. 2 раза в день внутрь. Rp.: Sol. Diazepam 0,5% - 2 ml. D.t.d. N. 6 in amp. S. По 2 мл в/м на ночь.	Relanium

**КАРДИОЛОГИЯ
6 КУРС**

№	Рецепты	Аналоги
---	---------	---------

Диуретики		
1.	Rp.: Dr. Indapamidi retardi 0,0015 N.30 D.S. Одну таблетку утром натощак.	Arifon retard, Indapamide MR
2.	Rp.: Tab. Acetazolamidi 0,25 N.24 D.S. По одной таблетке 3 раза в день 3 дня.	Diacarb
Ингибиторы АПФ		
3.	Rp.: Tab. Perindopriili 0,01 N.30 D.S. По 1 таблетке 1 раз в сутки.	Prestarium A
4.	Rp.: Tab. Ramipriili 0,01 N.28 D.S. По 1 таблетке 1 раз в сутки.	Tretace, Hartil
5.	Rp.: Tab. Phozinopriili 0,02 N.28 D.S. По 1 таблетке 2 раза в сутки.	Monopril
Бета-блокаторы		
6.	Rp.: Tab. Betaxololi 0,02 N.28 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день.	Locren
7.	Rp.: Tab. Carvediloli 0,0125 N.30 D.S. По 1 таблетке 2 раза в день.	Dilantred, Carvetrend
Антагонисты кальция		
8.	Rp.: Tab. Amlodipini 0,005 N.30 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день.	Norvasc, Amlotop
Агонисты альфа2- адренорецепторов		
9.	Rp.: Sol. Clonidini hydrochloridi 0,01% - 1ml D.t.d.N. 10 in amp. S. Растворить в 10 мл 0,9% раствора NaCl 1мл раствора, вводить в вену в течение 3-5 минут. Rp.: Tab. Clonidini hydrochloridi 0,00015 N.50 D.S. По 1 таблетке под язык при гипертоническом кризе.	Clofelin
Блокаторы АТ1 рецепторов ангиотензина-2		
10.	Rp.: Tab. Losartani 0,05 N.20 D.S. По 1 таблетке 2 раза в день.	Cozaar, Lozap
11.	Rp.: Tab. Irbesartani 0,15 N.28 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день.	Aprovel
Статины		
12.	Rp.: Tab. Simvastatini 0,02 N.28 D.S. По 1 таблетке в день вечером во время ужина.	Zocor, Simgal, Simvor
13.	Rp.: Tab. Atorvastatini 0,01 N.30 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день.	Liprimar, Atoris, Torvacard
14.	Rp.: Rosuvastatini 0,01 N.28 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день.	Crestor
Антиаритмические средства		
15.	Rp.: Sol. Propafenoni 0,35% - 20ml D. t. d. N. 5 in amp. S. В вену по 20мл в течение 3-6 минут под контролем ЭКГ. Rp.: Tab. Propafenoni 0,15 N.50 D.S. По 1 таблетке 3 раза в день.	Rytmonorm, Propanorm
Тромболитики		
16.	Rp.: Actilise 0,05 D.t.d.N.2 S. Растворить в 100мл воды для инъекций, вводить внутривенно.	Alteplase
Непрямые антикоагулянты		
17.	Rp.: Tab. Warfarini 0,0025 N.50	Warfarin

	D.S. По 1 таблетке вечером под контролем МНО	
Антибиотики		
18.	Rp.: Imipenemi 0,5 D.t.d.N. 10 S. Растворить в 200мл 0.9% раствора NaCl, в вену капельно 2 раза в день	Imipemid

ГЕМАТОЛОГИЯ 4 КУРС

№	Рецепты	Аналоги
Препараты железа		
1.	Rp.: Ferri lactatis 1,0 D.t.d. N.20 in caps. S: Внутрь по 1 капсуле 3 раза в день, после еды в течении 4-6 недель.	
2.	Rp.: "Fenules" D.t.d. N.10 in caps. S: По 1 капсуле 2 раза в сутки, после еды в течении 3-х месяцев.	
3.	Rp.: Tab. "Tardyferonum" N.30 D.S: По 2 таб. в сутки, после еды в течении 2-х месяцев.	
4.	Rp.: "Aktiferrinum" D. t.d. N.50 in caps. S: По 1 капсуле 3 раза в сутки, после еды.	
5.	Rp.: "Ferretab" D. t.d. N.30 in caps. S. По 1 капсуле 2 раза в сутки, после еды в течении 2 месяцев.	
6.	Rp.: Dr. "Ferroplex" N.100 D.S. По 2 капсулы 3 раза в сутки в течении 4-6 недель.	
7.	Rp.: Sol. "Ferrum-Lek"-2 ml D. t.d. N.50 in amp. S. В/м 2 мл. ежедневно.	
8.	Rp.: Sol. "Ferrum-Lek"- 5 ml D. t.d. N.10 in amp. S. По 5 мл в/в струйно ежедневно.	
9.	Rp.: Tab. «Ferrum-Lek» N.100 D.S: По 1 жевательной таблетке 2 раза в сутки, после еды.	
10.	Rp.: Tab. «Ferro-gradummet» N.30 D.S: По 1 таблетке 3 раза в сутки, после еды в течении 6 недель.	
11.	Rp.: Tab. "Sorbifer" N.50 D.S: По 1 таб. 1 раз в сутки в течении 4 месяцев.	
Витамины		
12.	Rp.: Sol. Цианкобаламини 0,05% - 1 ml D.t.d. N.10 in amp. S. В/м ежедневно по 2 мл неделю, далее по 1 мл в/м ежедневно 7 дней и при Hb 120 г/л по 1 мл в/м 2 раза в неделю 4 недели.	Vitaminum B ₁₂
Иммунодепрессант		
13.	Rp.: Ciclosporin A 0,05 D.t.d. N. 50 in caps. S. По 12 капсул в день на 2 приема, принимать 6 месяцев при апласт. анемии.	Sandimmun-Neoral

ГЕМАТОЛОГИЯ 5 КУРС

№	Рецепты	Аналоги
---	---------	---------

1.	Rp: Tab. Melphalani 0,002 N.25 D. S. Внутрь по 3 табл. в день в течение 10 дней при множественной миеломе в схеме “М-2”.	Alkeran
2.	Rp: Vincristini 0,001 D.t.d. N. 3. S. В вену струйно 1,4 мг/м ² (2 mg) на 20 мл физ. раствора 1 раз в неделю (схема “М-2”) при множественной миеломе.	
3.	Rp: Belustini 0,04 D. N.10 in caps. S. 2 капсулы внутрь в 1-ый день схемы “М-2” при множественной миеломе.	ССНУ
4.	Rp: Lomustine 0,04 D.t.d. N.10 in caps. S. 2 капсулы внутрь в 1-ый день схемы “М-2” при множественной миеломе.	СииНУ
5.	Rp: Cyclophosphani 0,2 D.t.d. N.10 S. В вену капельно 600 мг на физиологическом растворе в 1-ый день схемы “М-2” при множественной миеломе.	
6.	Rp: Tab. Prednisoloni 0,005 N.100 D. S. Внутрь 12 таб. ежедневно с 1 по 14 дни схемы “М-2” при множественной миеломе с постепенным снижением с 8-го дня (1/2 таб. в день) и до отмены. Сочетать прием препарата с антицидами или H ₂ -блокаторами и препаратами калия.	
7.	Rp: Hydroxycarbamidi 0,5 D. N. 100 in caps. S. Внутрь по 2 капсулы в день длительно под контролем лейкоцитов, тромбоцитов и размеров селезенки при эритремии. Количество лейкоцитов не снижать менее 5,0x10 ⁹ /л.	Hydrea
8.	Rp: Tab. Busulfani 0,002 N.100 D. S. Внутрь по 2 таб. в день под контролем лейкоцитов и тромбоцитов. Курсы непродолжительные при эритремии.	Myleran

ГЕМАТОЛОГИЯ 6 КУРС

№	Рецепты	Аналоги
Антиметаболиты		
1.	Rp.: Citarabini 0,1 D.t.d. N.20 S: 100 мг/м ² , т.е. 200-300 мг в/в капельно 2 р. в сутки в схеме “7+3”= 7 дней при ОМЛ; при ОЛЛ, при ХМЛ (бластный криз); п/к по 25 мг ежедневно N.10-20. Для профилактики и лечения нейрорлейкимии используется 15 мг цитозара в с/м канал в сочетании с преднизолоном 10-15 мг и метотрексатом 15 мг. Контроль Z-ты крови.	Cytozar
2.	Rp.: Tab. Methotrexati 0,0025 –N.100 D.S: По 8 таб. (20 мг) в неделю при ХМЛ, ОЛЛ, ЛГМ. Под контролем Z-тов крови.	
3.	Rp.: Methotrexati 0,01 D.t.d. N.20 S: 20 мг. в/м в неделю рпри ХМЛ (фаза акселерации N. 2-3-4); 15 мг интратенально при ОЛЛ в сочетании цитозаром и преднизолоном.	

4.	Rp.: Tab. Mercaptopurini 0,05 N.25 D.S: по 2 таб. ежедневно 28 дней (II фаза индукции ремиссии) при ОЛЛ; в фазу акселерации при ХМЛ (сочетают с миелосаном, гидреа). Контроль за Z-крови, не снижать их менее $2,0-3,0 \times 10^9$ /л.	Puri-netol
Противоопухолевые антибиотики		
5.	Rp.: Rubomycini hydrochloridi 0,02 D.t.d. N.20 S: 40 мг/м ² , т.е. 60-80 мг в/в одномоментно в 1,2,3-й дни схемы "7+3" при ОЛМ или 1 раз в неделю N.4 (1й, 8й, 15й и 22й день) в сочетании с винкристином при ОЛЛ в 1 фазу индукции ремиссии.	Daunorubicinum
6.	Rp.: Adriamicini 0,01 D.t.d.N. 10 S: 15 мг/м ² в/в в 1,8 и 15 дни схемы Н: Деха при ОЛЛ.	Doxorubicinum, Adriablasrin
7.	Rp.: Mitoxantroni hydrochloridi 0,002 D. t.d.N.10 in amp. S: 12 мг/м ² в/в в 1й, 2й и 3 дни ч/з 2 часа после введения цитозара (цитарабина) в виде 20 мин. инфузии при ОМЛ.	Novatron
Алконоиды противоопухолевого действия		
8.	Rp.: Vincristini 0,0005 D.t.d. N 10. S: 1,4 мг/м ² в/в 1 раз в неделю при ОЛЛ. N.4.	Oncovinum
Производные бис (β- хлорэтил) амина		
9.	Rp.: Tab. Chlorbutini 0,002 N.50 D. S: Суточная доза при ХЛЛ 2-10 мг (зависит от лейкоцитоза); курс лечения 3-6 недель и повторяется при возобновлении симптомов заболевания, контроль осуществляется по количеству лейкоцитов 2-1 раз в неделю.	Leukeran
10.	Rp.: Cyclophosphani 0,2 D.t.d. N.20 in amp. S: по 400 мг в/в через день N.7-8 раз в схеме СVP при ХЛЛ под контролем лейкоцитов крови 2 раза в неделю. При Z = $2,5 \times 10^9$ /л Тр менее 100×10^9 /л – лечения прекращать. Существуют другие схемы лечения этим препаратом.	Cyclophamidum, Endoxan
Противоопухолевые, цитостатические препараты		
11.	Rp.: Caps. Hidroхуcarbamide 0,5 N.10 D.S: Назначается при ХЛЛ, при лейкоцитах более 50×10^9 /л-4-6 капсул в день при лейкоцитах более $10-15 \times 10^9$ /л-2-3 капсул в день при лейкоцитах более 10×10^9 /л-1 капсула в день. Прекращать лечение при лейкоцитах $3,10^9$ /л.	Hydrea
Эфиры дисульфоновых кислот		
12.	Rp.: Tab. Myelosani 0,002 N.10 D.S: Применяется при ХЛЛ, доза определяется лейкоцитозом и спленомегалией. При лейкоцитах 200×10^9 /л –2-3 таб в день и уменьшают дозу при снижении лейкоцитов (контроль 1 раз в неделю). Лечение длительное, не снижать лейкоциты менее $10-7,0 \times 10^9$ /л. При рецидивах заболевания лечение возобновляют.	Myleran
Ферментные препараты, применяемые для лечения онкологических заболеваний.		

13.	Rp.: L-Asparaginasī 3000 ME D.t.d N.50. S: в/в капельно по 10.000-15.000 ME N.14 ежедневно с 15-20 дня I-ой фазы индукции ремиссии Берлинского протокола при ОЛЛ.	
Колониястимулирующие факторы		
14.	Rp.: Molgramostini 0,000050 S: 10мкг/кг ч/з 24 часа после последнего введения п/опухалевой терапии в течение 7-10 дней; при МДС, АА. При трансплантации костного мозга (ТКМ)-препарат вводят в/в. Препарат используется при цитостатической лейкопении.	Neukomax
Гемопоэтический фактор		
15.	Rp.: Filgrastimi 30%-1 ml D. t.d. N.30 in amp. S: 5мг/кг, т.е. на 60 кг-300мг филграстима разводить в 5% глюкозе в/в или п/к в течение 14-28 дней. Применяют ч/з 24 часа после использование цитостатиков в случаях нейтропении.	Neupogen
Антигеморрагические и гемостатические средства		
16.	Rp.: Thrombini 10 ml (125ED) D.t.d N.10 S: применяется только местно при б.Верльгофа, АА.	
17.	Rp.: Spongia haemostatica 1,0 N.20 S: Гемостатическая губка применяется местно для остановки кровотечения.	
18.	Rp.: Sol. Helatinae medicinalis 10%-10 ml D. N. 10 in amp. S: по 10-20 мл в/в, подогрев раствор перед введением до температуры тела.	
19.	Rp.: Sol. Adroxoni 0,025%-1 ml. N.10 S: может применяться местно, в/в или п/к –1 мл х 1-4 раза. Можно сочетать с другими гемостатическими средствами при желудочно-кишечных кровотечениях.	
Витамины		
20.	Rp.: Sol. Vicasoli 1%-1 ml D. N.10 in amp. S: по 1-2 мл в/м 1 раз в день 3-4 дня.	
Ингибитор фибринолиза		
21.	Rp.: Sol. E-Acidi aminocorponici 5%-100 ml D. N. 5 S: в/в капельно для остановки кровотечения в случаях повышенной фибринолитической активности крови (А.А, в хирургический и акушерской практике, заболеваниях печени, острым панкреотите).	
Ангиопротекторы		
22.	Rp.: Sol. Etamsylati 12,5%-2 ml D. N. 10 in amp. S: в/в, в/м и п/к 2-4 мл х 2 раза а день.	Dicynon
Препараты кальция		
23.	Rp.: Calcii chloridi 10%-10 ml in amp N.10 S: 10 мл в/в, как кровоостанавливающее средство при лучевой болезни, геморрагии, васкулите.	
Антимоноцитарный иммуноглобулин (лошадиный)		

24.	Rp.: Atgami 5 ml D.t.d.N.5 in amp S: 20 мг/кг (1200 мг) в/в капельно в течении 12 часов ежедневно-5 дней при апластической анемии. Перед введением делается проба на переносимость препарата (см. инструкцию).	
Эритропоэтин		
25.	Rp.: Recormoni 0,3 ml (500 ME) S: п/к 500 ME ежедневно N.6. При анемиях цитостатических, ММ, ЛГМ, ХЛЛ и ХПН.	

НЕФРОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ 5 КУРС

№	Рецепты	Синонимы
1.	Rp.: Ampicillini 0,5 D.t.d. N.5. S. В мышцу по 0,5 6 раз в день, разведя предварительно содержимое 1 флакона 2,5 мл физиологического раствора.	
2.	Rp.: Caps. Furazidini 50 mg N.30 D.S.Внутри по 1 капсуле 3 раза в день после еды.	Furamag
3.	Rp.: Tab. Nitroxolini 0,05 N.50 D.S. Внутри по 2 таблетки 4 раза в день.	5-NOK
4.	Rp.: Tab. Diclofenaci 0,1 N.10 D.S. Внутри по 1 таб. на ночь. Rp.: Sol. Diclofenaci 2,5 % - 3 ml D. t. d. N. 15 in amp. S. Внутримышечно по 3 мл. в день.	Ortophen
5.	Rp.: Tab. Ibuprofeni obductas 0,2 N.30 D.S.Внутри по 1 таблетке 4 раза в день после еды.	Brufen
6.	Rp.: Tab. Indometacini 0,025 N.10 D.S. Внутри по 1 таблетке 2 раза в день.	Metindol
7.	Rp.: Tab. Diclofenaci 0,05 N.10 D.S. Внутри по 1 таблетке 3 раза в день после еды.	Voltaren, Ortophen
8.	Rp.: Tab. Naproxeni 0,25 N.30 D.S. Внутри по 2 таблетке 2 раза в день.	Naprosyn, Naprobene
9.	Rp.: Tab. Prednisoloni 0,005 N.20 D.S. По схеме 3 таблетки +2 таблетки +1 таблетка после еды.	
10.	Rp.: Tab. Methylprednisoloni 0,004 N.30 D.S. По 2 таблетки утром. Rp.: Sol. Methylprednisoloni 4% - 1 ml D. t. d. N.10 in amp. S. Внутримышечно медленно по 1 мл. в день.	Methypred
11.	Rp.: Tab. Azathioprini 0,05 N.50 D.S. По 1 таблетке 2 раза в день.	Imuran
12.	Rp.: Tab. Methotrexati 0,0025 N.50 D.S. Внутри по 1 таблетке 3 раза с интервалом в 12 часов 1 раз в неделю.	

13.	Rp.: Susp. Crysanoli 5 %-2 ml D.t.d. N.25 in amp. S. По 2 мл в мышцу 1 раз в 2-5 дней.	
14.	Rp.: Sol. Tauredoni 2 %-0, 5 ml D.t.d. N.10 in amp. S. По 0.5 мл в мышцу 1 раз в неделю.	
15.	Rp.: Tab. Dipyrnidamoli 0,025 N.30 D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день (натощак за 1 час до еды).	Curantyl
16.	Rp.: Tab. Furosemidi 0,04 N.50 D.S. Внутрь по 1 таблетке утром за 20 минут до еды. Rp.: Sol. Furosemidi 1% -2 ml D.t.d. N.10 in amp. S. В вену по 4 мл утром на 20 мл физиологического раствора.	Lasix
17.	Rp.: Sol. Lespenephyryli 100 ml D.t.d. N.1 S. Внутрь по 1-2 дозированной ложке в сутки.	Lespeflan
18.	Rp.: Tab. Furosemidi 0,04 N.50 D.S. Внутрь по 1 таб. (утром). Rp.: Sol. Furosemidi 1% - 2 ml D. t. d. N. 5 in amp. S. В/вено по 1-2 мл. утром.	Lasix
19.	Rp.: Tab. Allopurinoli 0,1 N.30 D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день после еды.	Purinol
20.	Rp.: Tab. Hydrochlorothiazidi 0,025 N.20 D.S. Внутрь по 1 таб. Утром.	Hypothiazid
21.	Rp.: Caps. Chondroitini sulfati 0,25 N.60 D.S. Внутрь по 3 капсулы 2 раза в день в течение 3 недель. Далее по 1 капсуле 2 раза в день не менее 3 месяцев.	Structum
22.	Rp.: Heparini 5 ml (1ml-5000 ED) D.t.d. N.5 in amp. S. Под кожу живота по 1 мл 3 раза в день под контролем АЧТВ, 14 дней.	
23.	Rp.: Sol. Alflutopi 1% - 1 ml D.t.d. N. 5 in amp. S. В мышцу по 1 мл ежедневно в течение 20 дней.	
24.	Rp.: Glucosamine 1,5 D.t.d. N.20. S. Внутрь по 1 пакетику, разведя в стакане воды, не менее 6 недель.	Dona
25.	Rp.: Nadroparini calcii 0,6 ml D. t. d. N. 10 S. По 0,6 мл п/к 1 раз в день	Fraxiparine

**НЕФРОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ
6 КУРС**

№	РЕЦЕПТЫ	СИНОНИМЫ
---	---------	----------

1.	Rp.: Cyclophosphamidi 0,2 D. t. d. N.1 S. В/вено капельно на 250 мл физ. раствора. Rp.: Tab. Cyclophosphamidi 0,05 N.50 D.S. Внутрь по 1 таб. х 2 р. в день.	Cyclophosphan
2.	Rp.: Caps. Teraflexi N.60 D.S. По 2 капсуле 3 раза в день	Teraflex advans, Artra
3.	Rp.: Tab. Acidi alendronici 70 mg N.10 D.S. Внутрь по 1 таб. в неделю.	Fosamax, Tevanat, Forosa
4.	Rp.: Tab. Acidi ibandronici 150 mg N.3 D.S. Внутрь по 1 таб в месяц	Bonviva
5.	Rp.: Tab. Dexamethasoni 0,004 N.50 D.S. Внутрь по 2 таб. х 2 р. в день.	
6.	Rp.: Tab. Methylprednisoloni 0,004 N.30 D.S. Внутрь по 2 таб. в день, после еды.	
7.	Rp.: Diprospani 1 ml D. t. d. N.5 in amp. S. В мышцу 1 мл. 1 раз в две недели.	
8.	Rp.: Tab. Ca-D3-nicomedi 200 ME N.30 D.S. Внутрь по 1 таб 2 раза в день	
9.	Rp.: Caps. Alfacalcidoli 0,25 N.30 D.S. Внутрь по 1 таб 2 раза в день	Alfa-D3-teva
10.	Rp.: Acidi zolendronici 5 mg-100 ml D.S. внутривенно капельно 1 раз в год	Aclasta
11.	Rp.: Tab. Piroxicami 0,02 N.10 D.S. Внутрь по 1 таб. х 3 р. в день.	
12.	Rp.: Infliximabi 100 mg N.5 D.S. внутривенно капельно из расчета 5 мг/кг	Remikeid
13.	Rp.: Rituximabi 10 mg N.5 D.S. внутривенно капельно из расчета 375 мг/м ²	Mabthera
14.	Rp.: Caps. Piascledini 700 mg N.30 D.S. Внутрь по 1 капс в день	
15.	Rp.: Tab. Mofetili mycophenolati 1,0 D.S. Внутрь по 1 таб. 2 раза в день.	
16.	Rp.: Caps. Celecoxibi 200 mg N.30 D.S. Внутрь по 1 капс 2 раза в день	Celebrex
17.	Rp.: Tab. Etoricoxibi 60 mg N.30 D.S. Внутрь по 1 таб. в день.	Arcoxia
18.	Rp.: Tab. Delagili 0,25 N.30 D.S. Внутрь по 1 таб. х 3 р. в день (после еды).	
19.	Rp.: Tab. Hydroxychlorogvini 0,2 N.60 D.S. Внутрь по 2 таб. х 3 р. в день.	Plaqvenil
20.	Rp.: Tab. D-Penicillamini 0,25 N.100 D.S. Внутрь по 1 таб. х 3 раза в день.	
21.	Rp.: Tab. Colchicini 0,001 N.20 D.S. Внутрь по 1 таб. х 3 р. в день при остром приступе подагры до достижения эффекта.	
22.	Rp.: Sol. Pentoxuphyllini 2%- 5 ml D. t. d. N.5 in amp. S. По 5 мл внутривенно на 250 мл физ. раствора натрия хлорида 1 раз в сутки. Rp.: Tab. Pentoxuphyllini 0,1 N.60	Trental, Vazonit

	D.S. По 1 таб. х 3 р. в день	
23.	Rp.: Tab. Ticlopidini 0,25 N.20 D.S. Внутрь по 1 таб. х 2 раза в день (во время еды в течение 4 месяцев).	Ticlid
24.	Rp.: Tab. Diosmini 0,5 N.30 D.S. Внутрь по 1 таб. х 2 р. в день во время еды.	Detralex
25.	Rp.: Calcitonin 100 ME - 1 ml D. t. d. N.20 in amp. S. По 100 ME внутримышечно в течение 10 дней, затем по 100 ME интраназально по 2 раза в день длительно.	Miacalcic
26.	Rp.: Alprostadili 0,000002 D. t. d. N.10 in amp. S. Содержимое 3 ампул развести 250 мл физ. раствора. В вену капельно в течение 3 часов.	Vazaprostan
27.	Rp.: Sol. Cycloferoni 12,5% - 2 ml D.t.d. N.5 in amp. S. Внутримышечно по 2 мл по схеме.	
28.	Rp.: Caps. Ciclosporini 0,025 N.50 D.S. По 5 мг на кг веса больного.	Sandimmun neoral, Ciclosporin Hexal
29.	Rp.: Dimetyl sulfoxidi 50% - 100 ml D.S. Местно аппликации при разведении 1: 2 дистиллированной водой.	
30.	Rp.: Tab. Nimesulidi 0,1 N.30 D.S. Внутрь по 1 таб. х 2 р. в день, после еды.	Mesulid, Nise

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 4 КУРС

№	Рецепты	Аналоги
Инсулины короткого действия		
1.	Rp: Actrapid NM 10 ml (1ml-40ED) D.t.d.N. 5 S. По 4 ЕД подкожно за 30 мин до еды.	
2.	Rp: Actrapid NM penfill 3 ml (1ml-100ED) D.t.d.N. 5 S. По 6 ЕД подкожно за 30 мин до еды.	
Инсулины ультракороткого действия		
3.	Rp: Humalogi penfill 3 ml (1ml-100ED) D.t.d.N. 5 S. По 4 ЕД подкожно после еды.	
4.	Rp: Novorapidi penfill 3 ml (1ml-100ED) D.t.d.N. 5 S. По 4 ЕД подкожно после еды.	
Инсулины средней продолжительности действия		
5.	Rp: Susp. Protaphani NM penfill 3 ml (1ml-100ED) D.t.d.N. 5 S. Вводить подкожно 12 ЕД в 7 и 14 ЕД в 21 час.	
Инсулины длительного действия		
6.	Rp: Glargini 3 ml (1ml-100ED) D.t.d.N. 5 S. Вводить подкожно в 22 часа по 20 ед.	Lantus
7.	Rp: Levemiri 3 ml (1ml-100ED) D.t.d.N. 5	Detemir

	S. Вводить подкожно в 22 часа по 20 ед.	
Пероральные сахароснижающие средства (группа сульфанилмочевины)		
8.	Rp: Tab. Glipizidi 0,005 N.100 D.S. По 2 таблетки 3 раза в день за 30 мин. до еды.	Glibenes, Minidiab
9.	Rp: Tab. Gliclazidi 0,03 N.30 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день перед завтраком.	Diabetoni MB
10.	Rp: Tab. Glibenclamidi 0.005 N.50 D.S. По 1 таблетке 2 раза в день за 30 мин до еды.	Maninil, Betanas, Glibamid, Daonil
11.	Rp: Tab. Gliquidone 0,03 N.60 D.S. По 1 таблетке 2 раза в день в начале еды.	Глюренорм
12.	Rp: Tab. Glimperiridi 0,001 N.100 D.S. По 1 таблетке ежедневно утром перед завтраком	Amaril
Пероральные сахароснижающие средства (группа бигуаниды)		
12.	Rp: Tab. Metformini 0,5 N.100 D.S. По 1 таблетке 2 раза в день (во время или после еды)	Siofor, Glucofag, Gliformin
Пероральные сахароснижающие средства (комбинированные: бигуанид + производное сульфанилмочевины)		
13.	Rp: Tab. «Glibometum» 0.0025 N.40 D.S. По 2 таблетки 2 раза в день.	
Антитиреоидные препараты (тиреостатики)		
14.	Rp: Tab. Mercasolili 0,005 N. 50 D.S. По 2 таблетки 3 раза в день до достижения эутиреоза.	
Йодсодержащие препараты		
15.	Rp: Tab. «Iodid 200» N.50 D.S. По 1 таблетке в день ежедневно.	
16.	Rp: Tab. «Iodomarin 200» N.50 D.S. По 1 таблетке в день ежедневно.	
Гормоны щитовидной железы		
17.	Rp: Tab. Levothyroxini 0,0001 N.50 D.S. По 1 таблетке в день за 20-30 минут до еды принимать постоянно.	
18.	Rp: Tab. «Thyreosomb» N.40 D.S. По 1 таблетке 2 раза в день.	
Аналог вазопрессина		
19.	Rp: Tab. Minirini 0.0002 N.30 D.S. По 1 таблетке 3 раза в день.	Desmopressin
Ингибитор стероидогенеза в надпочечнике		
20.	Rp: Tab. Mamomiti 0,25 N.100. D.S. По 1 таблетке 3 раза в день.	Aminoglutethimide
Ингибитор дофаминергических рецепторов		
21.	Rp: Tab. Parlodeli 0,0025 N.50 D.S. По ½ таблетки 2 раза в сутки.	Bromocriptin
Альфа-адреноблокатор		
22.	Rp: Tropapheni 0.02 D.t.d.N. 3 in ampull. S. Содержимое ампулы растворить перед применением в 2 мл воды для инъекций, вводить внутривенно струйно по 2 мл.	Phentolamin
Глюкокортикостероиды		
23.	Rp: Tab. Prednisoloni 0,005 N. 100. D.S. По 1 таблетке утром после еды постоянно.	
Минералокортикоид		
24.	Rp: Tab. Cortineffi 0,0001 N. 20 D.S. По 1 таблетке в день.	
Аналог соматостатина		
25.	Rp: Sol. Octreotidi 0.05 % - 1 ml D.t.d.N. 5 in ampull. S. Подкожно 1-2 раза в день.	Sandostatin LAR

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
4, 6 КУРС

№	Рецепты	Аналоги
Миотропные спазмолитические средства		
1.	Rp.: Tab. Drotaverini 0,04 N.100 D.S. Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день до еды. Rp.: Caps. Mebeverini 0,2 N.10 D.S. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в день за 20 мин до еды.	Nospanum Duspatalin
Желчегонные средства		
2.	Rp.: Tab. "Allocholum" N. 50 D.S. Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день (после еды). Rp.: Tab. "Chophytol" 0,2 N. 60 D.S. Внутрь по 2-3 таблетки 3 раза в день перед приемом пищи в течение 10-20 дней.	
Антихолинергические средства		
3.	Rp.: Sol. Platyphyllini hydrotartratis 0,2 % 1 ml D.t.d. N. 10 in amp. S. Подкожно по 1 мл 2 раза в день.	
Средства для лечения протозойных инфекций		
4.	Rp.: Tab. Metronidazoli 0,5 N.30 D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день после еды. Rp.: Tab. Albendazoli 0,4 N.1000 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день в течение 3-х суток. Rp.: Tab. Nifurately 0,2 N.10 D.S. Внутрь по 2 таблетки 2-3 раза в день в течение 7-ми суток.	Trichopol Nemozole Macmiror
Антацидные средства		
5.	Rp.: Susp. Maaloxi 250 ml D.S. Внутрь по 1 дозированной ложечке 4 раза в день (за 30 мин. до еды).	Maalox
6.	Rp.: Susp. Gavisconi 150 ml D.S. Внутрь по 1 дозированной ложечки 4 раза в день (за 30 мин. до еды).	
Ферментные средства улучшающие процессы пищеварения		
7.	Rp.: Dr. Pancreatin 0,15 N.20 D.S. Внутрь по 1 драже во время еды, запивая большим количеством воды.	Kreon, Mezym
Антиферментные средства ингибиторы протеолиза		
8.	Rp.: Gordoxi 10 ml (100 000 ЕД) D.t.d. N. 25 in amp. S. В вену капельно по 10 мл на 200 мл физ. раствора каждые 2-3 часа.	
Пребиотики		
9.	Rp.: Susp. Lactulosi 500 ml D.S: Внутрь по 1-3 дозированных ложек. Rp.: Gran. Ornithini 3,0 N.30 D.S: Внутрь по 1 пакетику гранулята, растворенного в 200 мл воды после еды 2-3 раза в сутки. Rp.: Sol. Ornithini 10 ml (5 г в 10 ml) N.10 D.S: Внутривенно капельно, растворив 40 мл раствора	Duphalac Hepa-Merz

	орнитина в 500 мл инфузионного раствора.	
Блокатор протонной помпы		
10.	Rp.: Omeprazoli 0,02 D.t.d.N. 20 in caps. D.S. Внутрь по 1 капсуле 1 раз в день до еды.	Losec, Omez
Блокатор H2-гистаминовых рецепторов		
11.	Rp.: Tab. Famotidini 0,04 N.20 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день до еды.	Ulfamid
Антигельминтные средства		
12.	Rp.: Tab. Praziquanteli 0,06 N.6 D.S. 1 таб. на 10 кг массы тела. Приём внутрь в 22 ⁰⁰ , 2 ⁰⁰ и 6 ⁰⁰	Biltricid
Сульфаниламидный препарат		
13.	Rp.: Tab. Mesalazini 0,5 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день после еды, запивая большим количеством воды.	Salofalk, Pentasa,
Гормональные средства		
14.	Rp.: Octreotid 0,0001 D.t.d.N.5 S: П/к 3 раза в день 3-5 дней.	Sandostatin

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

5, 6 КУРС

Гепатопротекторы		
1.	Rp.: Caps. Acidi ursodeoxycholicі 0,25 N.25 D.S. Внутрь по 3 капсулы вечером, запивая большим количеством воды.	Ursofalk
2.	Rp.: Tab. Ademetionini 0,4 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день, утром и днём	Heptral
3.	Rp.: Caps. "Phosphoglive" N.10 D.S. Внутрь по 1-2 капсулы 3 раза в день в течение 30 дней.	
Диуретики		
4.	Rp.: Tabl. Spironolactoni 0,05 N.10 D.S. Внутрь по 1 табл. 2-3 раза в день.	Verospiron

ВПГ 4 КУРС

№	Рецепты	Аналоги
Нейролептики		
1.	Rp: Sol. Aminasini 2,5%-1 ml D.t.d.N. 10 in amp. S. Развести в 1 мл в 5 мл 0,5 % раствора новокаина. Ввести в/м однократно.	
2.	Rp: Sol. Droperidoli 0,25%-10 ml D.t.d.N. 6 in amp. S. 2 мл в вену в 20 мл 5% р-ра глюкозы однократно.	
3.	Rp: Tab. Aethaperazini 0,004 N. 100 D.S. По 1 таблетке 3 раза в день внутрь.	
Холинолитики		
4.	Rp: Sol. Atropini sulfatis 0,1%-1 ml D.t.d.N. 10 in amp.	

	S. Под кожу 1 мл 2 раза в день.	
Адреномиметики		
5.	Rp: Sol. Phenylephrini 1%-1 ml D.t.d. N.10 in amp. S. По 0,5 мл под кожу или в/в капельно.	Mesaton
6.	Rp: Sol. Noradrenalini hydrotartratis 0,2%-1 ml D.t.d. N.10 in amp. S. По 1 мл в/в капельно на 200 мл 5% р-ра глюкозы.	
Аналептики		
7.	Rp: Nikethamidi 1 ml D.t.d.N. 10 in amp. S. По 1 мл в/в при коллапсе.	Cordiamin
Наркотические анальгетики		
8.	Rp: Sol. Trimeperidini 2%-1 ml D.t.d.N.5 in amp. S. В/в струйно по 1 мл при сильных болях.	Promedol
9.	Rp: Sol. Fentanylli 0,005%-2 ml D.t.d.N.5 in amp. S. В/в струйно по 2 мл при сильных болях.	
Нестероидные противовоспалительные		
10.	Rp: Tab. Ketorolaci 0,01 N.100 D.S. По 1 таблетке внутрь при болях. Rp: Sol. Ketorolaci 3%- 1ml D.t.d. N.10 in amp. S. По 1 мл в/м	Ketanov
Метилксантины		
11.	Rp: Sol. Euphyllini 2,4%-10 ml D.t.d.N. 10 in amp. S. В/в на 20 мл изотонического раствора натрия хлорида. Вводить медленно!	
Антигистаминные		
12.	Rp: Sol. Dimedroli 1%-1 ml D.t.d. N.10 in amp. S. По 1 мл в мышцу 2 раза в день.	
Соли магния		
13.	Rp: Sol. Magnesii sulfatis 25%-10 ml D.t.d. N.10 in amp. S. По 10 мл в/в медленно на 10 мл физ. раствора.	
Гемостатики		
14.	Rp: Sol. Acidi aminocapronici 5%-100 ml D.t.d. N.5 S. В/в капельно по 1 флакону 2раза в день.	
17.	Rp: Sol. Etamsylati 12,5%-2 ml D.t.d. N.10 in amp. S. В/в струйно медленно по 2 мл развести в 20 мл физ. р-ра.	Dicynone
Кристаллоиды		
18.	Rp: "Disolum" – 400,0 D.S. 400 мл в/в капельно однократно.	
19.	Rp: "Plazmalitum"– 500,0 D.S. 400 мл в/в капельно однократно.	

**ПРОФПАТОЛОГИЯ
5 КУРС**

№	Рецепты	Фирменные названия
1	Rp: Sol. Tetacini – calcii 10%-20 ml D.t.d. N.10 in amp.	

	S. Предварительно содержимое ампулы растворить в 200 мл. 5 % раствора глюкозы. Вводить по 20 мл в вену капельно 2 раза в сутки.	
2	Rp: Sol. Calcii trinatiiri pentatati 5 % - 5 ml D.t.d. N.10 in amp. S. По 5 мл в вену медленно на физиологическом растворе через 1-2 дня под контролем АД и ЧСС.	Pentacin
3	Rp: Sol. Unithioli 5 % - 5 ml D.t.d. N.6 in amp. S. По 5 мл в мышцу 3 раза в день.	
4	Rp: Tab. Penicillamini 0,25 D.t.d. N.100. S. По 1 таблетке 2 раза в сутки за 1 час до еды или через 2 часа после еды.	Cuprenyl